

Писмено множење и дељење троцифреног броја једноцифреним броје-понављање

1. Израчунај:

$205 \cdot 3 = \underline{\hspace{2cm}}$

$124 \cdot 6 = \underline{\hspace{2cm}}$

$323 \cdot 2 = \underline{\hspace{2cm}}$

$256 : 8 = \underline{\hspace{2cm}}$

$716 : 4 = \underline{\hspace{2cm}}$

$666 : 9 = \underline{\hspace{2cm}}$

2. Израчунај:

$(618 - 202) : 2 = \underline{\hspace{4cm}}$

$480 : 4 \cdot 8 = \underline{\hspace{2cm}}$

$(196 + 63) : 7 = \underline{\hspace{2cm}}$

3. Софија има 3 исте лутке. Платила их је 126 динара. Колико би новца потрошила:

Ако би купила још 4 лутке?

Да је цена лутке мања за 2 динара?

**ЗАВИСНОСТ ПРОИЗВОДА ОД
ПРОМЕНЕ ЧИНИЛАЦА. СТАЛНОСТ**

ПРОИЗВОДА.

1. Ако је $a \cdot b = 156$, израчунај:

$$\left(\frac{a}{4} \right) \cdot b =$$

$$\left(a : 2 \right) \cdot b =$$

$$a \cdot \left(\frac{b}{3} \right) =$$

$$a \cdot \left(b : 4 \right) =$$

$$\left(a \cdot 2 \right) \cdot \left(b \cdot 4 \right) =$$

$$\left(a : 4 \right) \cdot \left(b : 3 \right) =$$

2. Ако је $a \cdot b = 240$, израчунај:

$$(a \cdot 2) \cdot b = \quad \quad \quad (a : 4) \cdot b =$$

$$a \cdot (b : 2) = \quad \quad \quad a \cdot (b \cdot 3) =$$

Једначине са множењем и дељењем

Отворите дату апликацију и покрените несумични точак. Одаберите најмање четири примера, препишите у свеску, решите и сутра ми пошаљите слику после 19 часова.

Једначине са дељењем

Једначине са непознатим дељеником

$$X : 9 = 67$$

$$X = 67 \cdot 9$$

$$X = 603$$

$$\text{ПР: } 603 : 9 = 67$$

Непознати дељеник добијамо када делилац и количник помножимо.

$$54 : X = 9$$

$$X = 54 : 9$$

$$X = 6$$

$$\text{ПР: } 54 : 6 = 9$$

Непознати делилац добијамо када дељеник поделимо са количником.

Задаци:

- 1) Уради у свеску први и пети задатак из Уџбеника на страни 90.
- 2) Уочи и препиши у свеску поступак решавања једначине $X : 4 + 17 = 88$, дат испод 3. задатка.
- 3) Реши у свеску шести задатак из уџбеника не преписујући текст.

Једначине са множењем

Да се подсетимо: Бројеви које множимо називају се чиниоци, а њихов резултат производ.

Када је један од чинилаца непознат, да би га открили постављамо **ЈЕДНАЧИНУ**

$$X \cdot 7 = 56$$

$$X = 56 : 7$$

$$X = 8$$

$$\text{ПР: } 8 \cdot 7 = 56$$

НЕПОЗНАТ ЧИНИЛАЦ ДОБИЈАМО КАДА ПРОИЗВОД ПОДЕЛИМО СА ПОЗНАТИМ ЧИНИОЦЕМ.